

Poprawa ruchomości stawów skokowych

+2. tydzień - Progresja - większa kontrola, nieco większy zakres lub dłuższy czas pracy.

Cel

Poprawa zgięcia grzbietowego, ruchomości łydki i kontroli stopy potrzebnej do chodu, przysiadu i schodów.

Uwaga kliniczna

Po świeżym skręceniu, złamaniu lub operacji zakres obciążania powinien wynikać z zaleceń prowadzącego lekarza/fizjoterapeuty.

1 JOGA 1

Pies z głową w dół - naprzemienne pięty - progresja

Ustaw się w psie z głową w dół. Naprzemiennie uginaj jedno kolano i kieruj przeciwną piętę w stronę podłoża. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Pięta nie musi dotykać podłogi. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

2 JOGA 2

Krzesło - dłuższe utrzymanie

Z pozycji stojącej cofnij biodra i ugnij kolana, utrzymując pięty na podłożu. Kolana przesuwają się nad stopami w komfortowym zakresie. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Nie zapadaj łuków stóp do środka. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

3 POZIOM 1 - łatwy

Kolano do ściany z większym zakresem

Stań przodem do ściany, stopa płasko. Prowadź kolano do ściany nad 2.-3. palcem bez odrywania pięty. Jeśli łatwo - odsuń stopę od ściany. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Kolano nie zapada się do środka. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

4 POZIOM 2 - średni

Wspięcia z pauzą w górze

Stań na obu stopach przy ścianie. Unieś pięty wysoko, zatrzymaj 1 s i opuszczaj przez 3 s. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Ruch symetryczny, ciężar na podstawie palucha i małego palca. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

5 POZIOM 3 - trudniejszy

Przysiad głęboki z podparciem - progresja

Trzymając się stabilnego oparcia, zejdź do przysiadu tak głęboko, jak pozwalają biodra i kostki. Pięty pozostają na podłożu. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Nie wymuszaj głębokości kosztem bólu kolan lub stóp. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.