

Poprawa ruchomości stawów skokowych

+4. tydzień - Etap funkcjonalny - mniej podparcia, większa kontrola i tolerancja obciążenia.

Cel

Poprawa zgięcia grzbietowego, ruchomości łydki i kontroli stopy potrzebnej do chodu, przysiadu i schodów.

Uwaga kliniczna

Po świeżym skręceniu, złamaniu lub operacji zakres obciążania powinien wynikać z zaleceń prowadzącego lekarza/fizjoterapeuty.

1 JOGA 1

Pies z głową w dół - naprzemienne pięty - wariant funkcjonalny

Ustaw się w psie z głową w dół. Naprzemiennie uginaj jedno kolano i kieruj przeciwną piętę w stronę podłoża. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Pięta nie musi dotykać podłogi. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

2 JOGA 2

Krzesło z wolnym wstawaniem i siadaniem

Z pozycji stojącej cofnij biodra i ugnij kolana, utrzymując pięty na podłożu. Kolana przesuwają się nad stopami w komfortowym zakresie. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Nie zapadaj łuków stóp do środka. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

3 POZIOM 1 - łatwy

Kolano do ściany w wykroku funkcjonalnym

Stań przodem do ściany, stopa płasko. Prowadź kolano do ściany nad 2.-3. palcem bez odrywania pięty. Jeśli łatwo - odsuń stopę od ściany. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Kolano nie zapada się do środka. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

4 POZIOM 2 - średni

Wspięcia jednonóż / większe obciążenie jednej nogi

Stań na obu stopach przy ścianie. Unieś piętę wysoko, zatrzymaj 1 s i opuszczaj przez 3 s. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Ruch symetryczny, ciężar na podstawie palucha i małego palca. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

5 POZIOM 3 - trudniejszy

Przysiad głęboki z podparciem - wariant funkcjonalny

Trzymając się stabilnego oparcia, zejdź do przysiadu tak głęboko, jak pozwalają biodra i kostki. Pięty pozostają na podłożu. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Nie wymuszaj głębokości kosztem bólu kolan lub stóp. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.