

Poprawa ruchomości stawów skokowych

Podtrzymanie - Utrzymanie efektu - mniejsza częstotliwość, dobra jakość i funkcjonalne warianty.

Cel
Poprawa zgięcia grzbietowego, ruchomości łydki i kontroli stopy potrzebnej do chodu, przysiadu i schodów.

Uwaga kliniczna
Po świeżym skręceniu, złamaniu lub operacji zakres obciążania powinien wynikać z zaleceń prowadzącego lekarza/fizjoterapeuty.

1

JOGA 1

Pies z głową w dół - naprzemiennie pięty - wariant podtrzymujący

Ustaw się w psie z głową w dół. Naprzemiennie uginaj jedno kolano i kieruj przeciwną piętę w stronę podłoża. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Pięta nie musi dotykać podłogi. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

2

JOGA 2

Krzesło podtrzymujące 2-3x/tydz.

Z pozycji stojącej cofnij biodra i ugnij kolana, utrzymując pięty na podłożu. Kolana przesuwają się nad stopami w komfortowym zakresie. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie zapadaj łuków stóp do środka. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

3

POZIOM 1 - łatwy

Kolano do ściany kontrolnie przed treningiem

Stań przodem do ściany, stopa płasko. Prowadź kolano do ściany nad 2.-3. palcem bez odrywania pięty. Jeśli łatwo - odsuń stopę od ściany. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Kolano nie zapada się do środka. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

4

POZIOM 2 - średni

Wspięcia podtrzymujące 2-3x/tydz.

Stań na obu stopach przy ścianie. Unieś pięty wysoko, zatrzymaj 1 s i opuszczaj przez 3 s. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Ruch symetryczny, ciężar na podstawie palucha i małego palca. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

5

POZIOM 3 - trudniejszy

Przysiad głęboki z podparciem - wariant podtrzymujący

Trzymając się stabilnego oparcia, zejdź do przysiadu tak głęboko, jak pozwalają biodra i kostki. Pięty pozostają na podłożu. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie wymuszaj głębokości kosztem bólu kolan lub stóp. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.