

Poprawa ruchomości bioder

1. tydzień - Etap wprowadzający - technika, tolerancja ruchu, mała/umiarkowana objętość.

Cel
Ruch biodra w zgięciu, wyprostie, rotacji i odwiedzeniu przy możliwie stabilnej miednicy.

Uwaga kliniczna
Przy nasilającym się bólu pachwiny, blokowaniu stawu lub bólu nocnym zakres powinien być oceniony indywidualnie.

1 JOGA 1 90/90

Usiądź z jedną nogą z przodu i drugą z boku, obie ugięte około 90°. Usiądź wysoko, a następnie delikatnie pochyl tułów nad przednią nogą.

Dawka: 20-30 s/stronę x 2

Wskazówka: Nie dociskaj kolan na siłę do podłogi.

2 JOGA 2 Niski wykrok

Z półkłęku podwin lekko miednicę i przesun ją do przodu, czując przód biodra nogi zakroczonej.

Dawka: 20-30 s/stronę x 2

Wskazówka: Nie wyginaj lędźwi.

3 POZIOM 1 - łatwy Kolano do klatki + krążenie biodrem

Leżąc na plecach, przyciągnij jedno kolano do komfortowego zakresu i wykonuj małe kółka udem w stawie biodrowym.

Dawka: 5-8 kółek w każdą stronę

Wskazówka: Miednica pozostaje możliwie spokojna.

4 POZIOM 2 - średni Wycieraczki w leżeniu

Leżenie na plecach, kolana ugięte, stopy szerzej. Opuszczaj oba kolana w jedną stronę, wróć i powtórz w drugą.

Dawka: 8-12/stronę

Wskazówka: Zakres bez bólu w pachwinie.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Przysiad kozacki

Stań szeroko. Przenieś ciężar na jedną nogę, uginając ją, a drugą pozostaw bardziej wyprostowaną. Wróć przez środek i zmień stronę.

Dawka: 5-8/stronę x 2

Wskazówka: Zaczynaj płytko i trzymaj się oparcia, jeśli potrzeba.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.