

Poprawa ruchomości bioder

Podtrzymanie - Utrzymanie efektu - mniejsza częstotliwość, dobra jakość i funkcjonalne warianty.

Cel
Ruch biodra w zgięciu, wyproście, rotacji i odwiedzeniu przy możliwie stabilnej miednicy.

Uwaga kliniczna
Przy nasilającym się bólu pachwiny, blokowaniu stawu lub bólu nocnym zakres powinien być oceniony indywidualnie.

1 JOGA 1 90/90 - wariant podtrzymujący

Usiądź z jedną nogą z przodu i drugą z boku, obie ugięte około 90°. Usiądź wysoko, a następnie delikatnie pochyl tułów nad przednią nogą. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie dociskaj kolan na siłę do podłogi. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

2 JOGA 2 Niski wykrok - wariant podtrzymujący

Z półkłęku podwiń lekko miednicę i przesun ją do przodu, czując przód biodra nogi zakroczonej. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie wyginaj lędźwi. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

3 POZIOM 1 - łatwy Kolano do klatki + krążenie biodrem - wariant podtrzymujący

Leżąc na plecach, przyciągnij jedno kolano do komfortowego zakresu i wykonuj małe kółka udem w stawie biodrowym. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Miednica pozostaje możliwie spokojna. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

4 POZIOM 2 - średni Wycieraczki w leżeniu - wariant podtrzymujący

Leżenie na plecach, kolana ugięte, stopy szerzej. Opuszczaj oba kolana w jedną stronę, wróć i powtórz w drugą. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Zakres bez bólu w pachwinie. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Przysiad kozacki - wariant podtrzymujący

Stań szeroko. Przenieś ciężar na jedną nogę, uginając ją, a drugą pozostaw bardziej wyprostowaną. Wróć przez środek i zmień stronę. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Zaczynij płytko i trzymaj się oparcia, jeśli potrzeba. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.