

Rozluźnienie przepony

+2. tydzień - Progresja - większa kontrola, nieco większy zakres lub dłuższy czas pracy.

Cel
Zmniejszenie nadmiernego udziału górnej klatki i mięśni pomocniczych oddechu, poprawa spokojnego oddechu dolnożebrowego.

Uwaga kliniczna
Ćwiczenia oddechowe wykonuj bez forsowania. Jeśli pojawi się zawrót głowy, przerwij, odpocznij i wróć do naturalnego oddechu.

1 JOGA 1 Pozycja krokodyla - Makarasana - progresja

Położ się na brzuchu, czoło oprzyj na złożonych dłoniach. Pozwól, by przy wdychu dolne żebra i brzuch delikatnie naciskały na podłoże. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Barki, szyja i szczęka rozluźnione. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

2 JOGA 2 Pozycja dziecka z sięganiem bocznym

Usiądź w kierunku pięt, oprzyj czoło. Wdychaj powietrze „do dolnych żeber i pleców”, a na wydechu rozluźniaj brzuch i barki. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Nie staraj się nabierać maksymalnie dużo powietrza. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

3 POZIOM 1 - łatwy Oddech 360° w leżeniu - progresja

Położ dłonie na dolnych żebrach. Wdech nosem: żebra delikatnie rozszerzają się na boki i do tyłu. Wydech: swobodnie opadają. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Górna część klatki porusza się niewiele. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

4 POZIOM 2 - średni Wydłużony wydech - progresja

Wdech nosem przez około 3-4 s, następnie spokojny wydech przez lekko złączone usta przez 5-7 s. Nie opróżniaj płuc na siłę. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Jeśli kręci się w głowie - skróć oddech i zrób przerwę. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Oddech boczno-żebrowy w leżeniu na boku - progresja

Położ się na boku, górną dłoń połóż na dolnych żebrach. Kieruj wdech pod dłoń, a przy wydechu pozwól żebrům opaść. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Oddychaj cicho i bez unoszenia barku. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.