

Ból barku / stożek rotatorów

+2. tydzień - Progresja - większa kontrola, nieco większy zakres lub dłuższy czas pracy.

Cel
Poprawa tolerancji unoszenia ramienia i stopniowe wzmacnianie stożka rotatorów oraz łopatki.

Uwaga kliniczna
Ćwiczenia dobieraj do drażliwości. Po świeżym urazie z nagłą utratą siły lub niemożnością uniesienia ramienia wymagana jest dalsza diagnostyka.

1 JOGA 1 Szczeniak przy ścianie - progresja

Stań przed ścianą, oprzyj dłonie i cofnij biodra, wydłużając boki tułowia oraz obręcz barkową bez wciskania barku w ból. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Zakres ma być swobodny; nie unosz barków do uszu. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

2 JOGA 2 Orzeł - ramiona - progresja

Skrzyżuj ramiona przed klatką, unieś łokcie do wygodnej wysokości i spokojnie oddychaj w górną część pleców. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Bez mrowienia i ostrego bólu barku. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

3 POZIOM 1 - łatwy Izometria rotacji zewnętrznej przy ścianie - progresja

Stań bokiem do ściany, łokieć przy tułowiu i delikatnie naciskaj grzbietem dłoni na ścianę bez ruchu barku. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Siła umiarkowana; ból nie powinien narastać po serii. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

4 POZIOM 2 - średni Ślizg ramion po ścianie z pauzą

Przesuwaj przedramiona w górę po ścianie, utrzymując szyję rozluźnioną i łopatkę płynnie obracającą się ku górze. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Nie wypychaj żeber do przodu. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Scaption bez obciążenia - progresja

Unieś ramiona w płaszczyźnie około 30° przed bokiem ciała do tolerowanego zakresu, powoli opuść. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Ruch kontrolowany, bez szarpania i unoszenia barków. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.