

Kontrola łopatki / dyskineza

+2. tydzień - Progresja - większa kontrola, nieco większy zakres lub dłuższy czas pracy.

Cel
Poprawa kontroli łopatki podczas unoszenia i obciążania kończyny górnej.

Uwaga kliniczna
Celem nie jest sztywne „ściągnięcie łopatek”, lecz płynna współpraca łopatki z ramieniem i klatką piersiową.

1 JOGA 1 Koci grzbiet z aktywnym odepchnięciem dłoni - progresja

W klęku podpartym zaokrąglaj łagodnie odcinek piersiowy, aktywnie odpychając podłogę i pozwalając łopatom rozsunąć się. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Nie zapadaj się między barkami. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

2 JOGA 2 Deska - dłuższa pauza

W podporze na dłoniach utrzymaj łokcie proste i delikatnie „odepchnij podłogę”, nie zaokrąglając przesadnie pleców. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Zaczynij z kolan, jeśli pełny podpor jest za trudny. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

3 POZIOM 1 - łatwy Serratus punch w leżeniu - progresja

Leżąc na plecach unieś rękę do sufitu, a następnie bez zginania łokcia sięgnij dłonią wyżej, unosząc łopatkę od podłoża. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Ruch mały i płynny. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

4 POZIOM 2 - średni Wall slide z wolnym opuszczaniem

Przesuwaj przedramiona po ścianie do góry, utrzymując lekkie odepchnięcie i spokojną szyję. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Nie dociskaj łopatek do kręgosłupa. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Y przy ścianie - progresja

Stań twarzą do ściany, unieś ręce po skosie do litery Y i delikatnie odklej dłonie bez unoszenia barków. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Zakres mniejszy, jeśli pojawia się kompensacja szyi. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.