

Sztywność barku / zamrożony bark

+2. tydzień - Progresja - większa kontrola, nieco większy zakres lub dłuższy czas pracy.

Cel
Stopniowa poprawa tolerancji ruchu i funkcji bez forsowania bolesnego końcowego zakresu.

Uwaga kliniczna
W wysokiej drażliwości preferuj częste, krótkie i łagodne ruchy. Agresywne rozciąganie może nasilić objawy.

1 JOGA 1 Pozycja dziecka z sięganiem bocznym

Oprzyj dłonie na krześle lub łóżku i cofnij biodra, pozwalając barkom wejść w wygodne zgięcie. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Nie wciskaj barku w ból. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

2 JOGA 2 Orzeł - łagodny wariant ramion - progresja

Skrzyżuj ramiona przed klatką i unieś łokcie tylko do komfortowego poziomu. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Pomiń przy ostrym bólu przedniej części barku. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

3 POZIOM 1 - łatwy Wahadło Codmana - progresja

Podeprzyj się zdrową ręką, rozluźnij bolesną kończynę i wykonuj małe koła oraz ruchy przód-tył. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Ramię ma być rozluźnione. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

4 POZIOM 2 - średni Ślizg ręki po stole - progresja

Siedząc przesunąć dłoń po stole do przodu, pozwalając tułowi lekko pochylić się za ręką. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Nie unosz barku do ucha. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Wspinanie palcami po ścianie - progresja

Wejść palcami po ścianie do tolerowanego poziomu i powoli wróć. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Nie utrzymuj długo bolesnego końca zakresu. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.