

Sztywność barku / zamrożony bark

+4. tydzień - Etap funkcjonalny - mniej podparcia, większa kontrola i tolerancja obciążenia.

Cel
Stopniowa poprawa tolerancji ruchu i funkcji bez forsowania bolesnego końcowego zakresu.

Uwaga kliniczna
W wysokiej drażliwości preferuj częste, krótkie i łagodne ruchy. Agresywne rozciąganie może nasilić objawy.

1 JOGA 1 Pozycja dziecka -> klęk podparty

Oprzyj dłonie na krześle lub łóżku i cofnij biodra, pozwalając barkom wejść w wygodne zgięcie. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Nie wciskaj barku w ból. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

2 JOGA 2 Orzeł - łagodny wariant ramion - wariant funkcjonalny

Skrzyżuj ramiona przed klatką i unieś łokcie tylko do komfortowego poziomu. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Pomiń przy ostrym bólu przedniej części barku. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

3 POZIOM 1 - łatwy Wahadło Codmana - wariant funkcjonalny

Podeprzyj się zdrową ręką, rozluźnij bolesną kończynę i wykonuj małe koła oraz ruchy przód-tył. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Ramię ma być rozluźnione. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

4 POZIOM 2 - średni Ślizg ręki po stole - wariant funkcjonalny

Siedząc przesunij dłoń po stole do przodu, pozwalając tułowi lekko pochylić się za ręką. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Nie unosz barku do ucha. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Wspinanie palcami po ścianie - wariant funkcjonalny

Wejdz palcami po ścianie do tolerowanego poziomu i powoli wróć. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Nie utrzymuj długo bolesnego końca zakresu. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.