

Sztywność barku / zamrożony bark

Podtrzymanie - Utrzymanie efektu - mniejsza częstotliwość, dobra jakość i funkcjonalne warianty.

Cel
Stopniowa poprawa tolerancji ruchu i funkcji bez forsowania bolesnego końcowego zakresu.

Uwaga kliniczna
W wysokiej drażliwości preferuj częste, krótkie i łagodne ruchy. Agresywne rozciąganie może nasilić objawy.

1 JOGA 1 Pozycja dziecka jako reset ruchowy

Oprzyj dłonie na krześle lub łóżku i cofnij biodra, pozwalając barkom wejść w wygodne zgięcie. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie wciskaj barku w ból. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

2 JOGA 2 Orzeł - łagodny wariant ramion - wariant podtrzymujący

Skrzyżuj ramiona przed klatką i unieś łokcie tylko do komfortowego poziomu. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Pomiń przy ostrym bólu przedniej części barku. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

3 POZIOM 1 - łatwy Wahadło Codmana - wariant podtrzymujący

Podeprzyj się zdrową ręką, rozluźnij bolesną kończynę i wykonuj małe koła oraz ruchy przód-tył. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Ramię ma być rozluźnione. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

4 POZIOM 2 - średni Ślizg ręki po stole - wariant podtrzymujący

Siedząc przesun dłoń po stole do przodu, pozwalając tułowi lekko pochylić się za ręką. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie unosz barku do ucha. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Wspinanie palcami po ścianie - wariant podtrzymujący

Wejdz palcami po ścianie do tolerowanego poziomu i powoli wróć. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie utrzymuj długo bolesnego końca zakresu. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.