

Łokieć tenisisty

1. tydzień - Etap wprowadzający - technika, tolerancja ruchu, mała/umiarkowana objętość.

Cel
Zmniejszenie bólu podczas chwytu i stopniowe zwiększenie tolerancji prostowników nadgarstka na obciążenie.

Uwaga kliniczna
Zmniejsz przeciążenie chwytu, ale unikaj całkowitego unieruchamiania. Nasilający się deficyt wyprostu palców wymaga diagnostyki neurologicznej.

1 JOGA 1 Dłonie odwrócone w klęku - łagodnie

W klęku podpartym ustaw dłonie palcami w stronę kolan tylko w tolerowanym zakresie i delikatnie cofnij biodra.

Dawka: 15-20 s x 2

Wskazówka: Bez drętwienia i ostrego bólu.

2 JOGA 2 Orzeł - ramiona

Skrzyżuj ramiona i wydłuż tył barków, utrzymując przedramiona rozluźnione.

Dawka: 20-30 s/stronę x 2

Wskazówka: Nie zaciskaj dłoni.

3 POZIOM 1 - łatwy Izometria wyprostu nadgarstka

Przedramię oprzyj na stole, drugą dłonią staw opór grzbietowi ręki bez ruchu w nadgarstku.

Dawka: 8-10 s x 6

Wskazówka: Siła umiarkowana.

4 POZIOM 2 - średni Powolny wyprost nadgarstka bez ciężaru

Przedramię na stole, dłoń poza krawędzią. Unieś i bardzo powoli opuść nadgarstek.

Dawka: 10-15 x 2-3

Wskazówka: Ruch ma być płynny.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Kontrolowany chwyt ręcznika

Ściskaj zrolowany ręcznik do umiarkowanej siły i powoli rozluźniaj.

Dawka: 8-12 x 2-3

Wskazówka: Nie prowokuj bólu utrzymującego się po ćwiczeniu.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.