

Łokieć tenisisty

+2. tydzień - Progresja - większa kontrola, nieco większy zakres lub dłuższy czas pracy.

Cel
Zmniejszenie bólu podczas chwytu i stopniowe zwiększenie tolerancji prostowników nadgarstka na obciążenie.

Uwaga kliniczna
Zmniejsz przeciążenie chwytu, ale unikaj całkowitego unieruchamiania. Nasilający się deficyt wyprostu palców wymaga diagnostyki neurologicznej.

1 JOGA 1 Dłonie odwrócone w klęku - łagodnie - progresja

W klęku podpartym ustaw dłonie palcami w stronę kolan tylko w tolerowanym zakresie i delikatnie cofnij biodra. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Bez drętwienia i ostrego bólu. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

2 JOGA 2 Orzeł - ramiona - progresja

Skrzyżuj ramiona i wydłuż tył barków, utrzymując przedramiona rozluźnione. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Nie zaciskaj dłoni. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

3 POZIOM 1 - łatwy Izometria wyprostu nadgarstka - progresja

Przedramię oprzyj na stole, drugą dłonią staw opór grzbietowi ręki bez ruchu w nadgarstku. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Siła umiarkowana. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

4 POZIOM 2 - średni Powolny wyprost nadgarstka bez ciężaru - progresja

Przedramię na stole, dłoń poza krawędzią. Unieś i bardzo powoli opuść nadgarstek. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Ruch ma być płynny. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Kontrolowany chwyt ręcznika - progresja

Ściskaj zrolowany ręcznik do umiarkowanej siły i powoli rozluźniaj. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Nie prowokuj bólu utrzymującego się po ćwiczeniu. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.