

Łokieć tenisisty

+4. tydzień - Etap funkcjonalny - mniej podparcia, większa kontrola i tolerancja obciążenia.

Cel
Zmniejszenie bólu podczas chwytu i stopniowe zwiększenie tolerancji prostowników nadgarstka na obciążenie.

Uwaga kliniczna
Zmniejsz przeciążenie chwytu, ale unikaj całkowitego unieruchamiania. Nasilający się deficyt wyprostu palców wymaga diagnostyki neurologicznej.

1 JOGA 1 Dłonie odwrócone w klęku - łagodnie - wariant funkcjonalny

W klęku podpartym ustaw dłonie palcami w stronę kolan tylko w tolerowanym zakresie i delikatnie cofnij biodra. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Bez drętwienia i ostrego bólu. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

2 JOGA 2 Orzeł - ramiona - wariant funkcjonalny

Skrzyżuj ramiona i wydłuż tył barków, utrzymując przedramiona rozluźnione. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Nie zaciskaj dłoni. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

3 POZIOM 1 - łatwy Izometria wyprostu nadgarstka - wariant funkcjonalny

Przedramię oprzyj na stole, drugą dłonią staw opór grzbietowi ręki bez ruchu w nadgarstku. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Siła umiarkowana. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

4 POZIOM 2 - średni Powolny wyprost nadgarstka bez ciężaru - wariant funkcjonalny

Przedramię na stole, dłoń poza krawędzią. Unieś i bardzo powoli opuść nadgarstek. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Ruch ma być płynny. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Kontrolowany chwyt ręcznika - wariant funkcjonalny

Ściskaj zrolowany ręcznik do umiarkowanej siły i powoli rozluźniaj. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Nie prowokuj bólu utrzymującego się po ćwiczeniu. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.