

Łokieć tenisisty

Podtrzymanie - Utrzymanie efektu - mniejsza częstotliwość, dobra jakość i funkcjonalne warianty.

Cel
Zmniejszenie bólu podczas chwytu i stopniowe zwiększenie tolerancji prostowników nadgarstka na obciążenie.

Uwaga kliniczna
Zmniejsz przeciążenie chwytu, ale unikaj całkowitego unieruchamiania. Nasilający się deficyt wyprostu palców wymaga diagnostyki neurologicznej.

1 JOGA 1 Dłonie odwrócone w kłku - łagodnie - wariant podtrzymujący

W kłku podpartym ustaw dłonie palcami w stronę kolan tylko w tolerowanym zakresie i delikatnie cofnij biodra. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Bez drętwienia i ostrego bólu. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

2 JOGA 2 Orzeł - ramiona - wariant podtrzymujący

Skrzyżuj ramiona i wydłuż tył barków, utrzymując przedramiona rozluźnione. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie zaciskaj dłoni. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

3 POZIOM 1 - łatwy Izometria wyprostu nadgarstka - wariant podtrzymujący

Przedramię oprzyj na stole, drugą dłonią staw opór grzbietowi ręki bez ruchu w nadgarstku. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Siła umiarkowana. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

4 POZIOM 2 - średni Powolny wyprost nadgarstka bez ciężaru - wariant podtrzymujący

Przedramię na stole, dłoń poza krawędzią. Unieś i bardzo powoli opuść nadgarstek. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Ruch ma być płynny. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Kontrolowany chwyt ręcznika - wariant podtrzymujący

Ściskaj zrolowany ręcznik do umiarkowanej siły i powoli rozluźniaj. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie prowokuj bólu utrzymującego się po ćwiczeniu. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.