

Łokieć golfisty

+2. tydzień - Progresja - większa kontrola, nieco większy zakres lub dłuższy czas pracy.

Cel
Stopniowe zwiększenie tolerancji zginaczy i pronatorów przedramienia na chwyt i obciążenie.

Uwaga kliniczna
Przy drętwieniu IV-V palca lub wyraźnym osłabieniu dłoni różnicuj problem z nerwem łokciowym.

1 JOGA 1 Dłonie grzbietami przed klatką - progresja

Połącz grzbiety dłoni przed klatką piersiową i delikatnie opuszczaj łokcie, utrzymując komfort w nadgarstkach. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Bez mrowienia. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

2 JOGA 2 Szczeniak z dłońmi na podwyższeniu - progresja

Oprzyj dłonie na krześle, cofnij biodra i wydłuż ramiona oraz boki tułowia. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Łokcie miękkie, bez przeprostu. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

3 POZIOM 1 - łatwy Izometria zgięcia nadgarstka - progresja

Drugą dłonią staw opór stronie dłoniowej ręki bez wykonywania ruchu. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Siła umiarkowana. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

4 POZIOM 2 - średni Powolne zgięcie nadgarstka bez ciężaru - progresja

Przedramię na stole, dłoń poza krawędzią. Zegnij i powoli wróć do neutralnej pozycji. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Nie ściskaj palców. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Pronacja i supinacja kontrolowana - progresja

Z łokciem przy tułowiu obracaj dłoń ku górze i ku dołowi w pełnym komfortowym zakresie. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Ruch wolny, łokieć stabilny. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.