

Cieśń nadgarstka / nerw pośrodkowy

+4. tydzień - Etap funkcjonalny - mniej podparcia, większa kontrola i tolerancja obciążenia.

Cel
Zmniejszenie prowokacji objawów i utrzymanie łagodnego ślizgu nerwu pośrodkowego oraz ruchomości nadgarstka.

Uwaga kliniczna
Nasilające się drętwienie, zanik kłębu kciuka lub utrwalona słabość wymagają dalszej diagnostyki.

1 JOGA 1 Góra z otwartymi dłońmi - wariant funkcjonalny

Stań swobodnie, ramiona wzdłuż tułowia, palce dłoni wydłużone i rozluźnione. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Nie utrzymuj nadgarstków w skrajnym zgięciu. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

2 JOGA 2 Anjali Mudra - dłonie przed klatką - wariant funkcjonalny

Złącz dłonie przed klatką na wysokości, która nie wywołuje parestezji. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Zmniejsz kąt w nadgarstku przy mrowieniu. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

3 POZIOM 1 - łatwy Otwieranie i zamykanie dłoni - wariant funkcjonalny

Naprzemiennie szeroko rozprostuj palce i lekko zamknij dłoń bez silnego ścisku. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Ruch bez bólu. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

4 POZIOM 2 - średni Ślizg nerwu w pozycji funkcjonalnej

Wykonuj stopniowe ustawienia dłoni, łokcia i barku jako płynny ślizg bez utrzymywania napięcia. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Nie rozciągaj nerwu na końcu ruchu. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Kontrola nadgarstka przy lekkim podporze - wariant funkcjonalny

Oprzyj dłonie o ścianę i delikatnie przenoś ciężar przód-tył. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Przerwij przy nasileniu drętwienia. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.