

Sztywność odcinka piersiowego / garb posturalny

+2. tydzień - Progresja - większa kontrola, nieco większy zakres lub dłuższy czas pracy.

Cel
Poprawa wyprost i rotacji odcinka piersiowego oraz pracy łopatek.

Uwaga kliniczna
Przy osteoporozie unikaj forsownego zgięcia i rotacji; ćwiczenia dobierz indywidualnie.

1 JOGA 1 Szczeniak - Uttana Shishosana - progresja

Z kłku podpartego przesunąć dłonie do przodu, pozostawiając biodra nad kolanami i wydłużając klatkę. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Nie zapadać szyi. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

2 JOGA 2 Kobra niska - progresja

Leżąc na brzuchu oprzyj przedramiona lub dłonie i unieś mostek, utrzymując ruch głównie w piersiowym odcinku. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Bez kompresji lędźwi. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

3 POZIOM 1 - łatwy Otwieranie książki z pełniejszym oddechem

Leżąc na boku obracać górne ramię i klatkę do tyłu, kolana pozostają razem. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Ruch płynny. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

4 POZIOM 2 - średni Wyprost piersiowy na oparciu - progresja

Usiądź, oprzyj górny odcinek pleców o krawędź oparcia i wykonaj łagodny wyprost. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Nie odchylaj głowy gwałtownie. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Wall angel - progresja

Plecy przy ścianie, przesuwaj ramiona w górę i w dół bez wypychania żeber. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Zakres dostosuj do barków. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.