

Sztywność odcinka piersiowego / garb posturalny

Podtrzymanie - Utrzymanie efektu - mniejsza częstotliwość, dobra jakość i funkcjonalne warianty.

Cel
Poprawa wyprost i rotacji odcinka piersiowego oraz pracy łopatek.

Uwaga kliniczna
Przy osteoporozie unikaj forsownego zgięcia i rotacji; ćwiczenia dobierz indywidualnie.

1 JOGA 1 Szczeniak - Uttana Shishosana - wariant podtrzymujący

Z kłęk podpartego przesun dłoń do przodu, pozostawiając biodra nad kolanami i wydłużając klatkę. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie zapadaj szyi. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

2 JOGA 2 Kobra niska - wariant podtrzymujący

Leżąc na brzuchu oprzyj przedramiona lub dłonie i unieś mostek, utrzymując ruch głównie w piersiowym odcinku. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Bez kompresji lędźwi. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

3 POZIOM 1 - łatwy Otwieranie książki 2-3x/tydz.

Leżąc na boku obracaj górne ramię i klatkę do tyłu, kolana pozostają razem. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Ruch płynny. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

4 POZIOM 2 - średni Wyprost piersiowy na oparciu - wariant podtrzymujący

Usiądź, oprzyj górny odcinek pleców o krawędź oparcia i wykonaj łagodny wyprost. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie odchylaj głowy gwałtownie. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Wall angel - wariant podtrzymujący

Plecy przy ścianie, przesuwaj ramiona w górę i w dół bez wypychania żeber. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Zakres dostosuj do barków. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.