

Ból lędźwiowy nieswoisty

+2. tydzień - Progresja - większa kontrola, nieco większy zakres lub dłuższy czas pracy.

Cel
Utrzymanie ruchu, poprawa kontroli tułowia i stopniowy powrót do obciążeń dnia codziennego.

Uwaga kliniczna
Nie ma jednego kierunku ruchu dobrego dla wszystkich. Dobieraj ćwiczenia do reakcji objawów i funkcji.

1 JOGA 1 Kot-krowa z oddechem

W kłku podpartym płynnie przechodź między łagodnym zgięciem i wyprostem kręgosłupa. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Ruch bez forsowania. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

2 JOGA 2 Pozycja dziecka z sięganiem bocznym

Cofnij biodra w kierunku pięt, ręce przed sobą i oddychaj spokojnie. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Pomiń, jeśli zgięcie nasila objawy. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

3 POZIOM 1 - łatwy Przetaczanie miednicy - progresja

Leżąc na plecach wykonuj małe ruchy przodo- i tyłopochylenia miednicy. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Bez mocnego dociskania pleców. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

4 POZIOM 2 - średni Most z pauzą 2-3 s

Unieś biodra do linii tułowia i ud, utrzymując swobodny oddech. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Nie przeprostuj lędźwi. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Bird dog z pauzą 3 s

Z kłku podpartego wyprostuj przeciwną rękę i nogę bez rotacji miednicy. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Zakres mniejszy przy bólu. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.