

Ból lędźwiowy nieswoisty

Podtrzymanie - Utrzymanie efektu - mniejsza częstotliwość, dobra jakość i funkcjonalne warianty.

Cel
Utrzymanie ruchu, poprawa kontroli tułowia i stopniowy powrót do obciążeń dnia codziennego.

Uwaga kliniczna
Nie ma jednego kierunku ruchu dobrego dla wszystkich. Dobieraj ćwiczenia do reakcji objawów i funkcji.

1 JOGA 1 Kot-krowa jako mobilizacja podtrzymująca

W klęku podpartym płynnie przechodź między łagodnym zgięciem i wyprostem kręgosłupa. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Ruch bez forsowania. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

2 JOGA 2 Pozycja dziecka jako reset ruchowy

Cofnij biodra w kierunku pięt, ręce przed sobą i oddychaj spokojnie. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Pomiń, jeśli zgięcie nasila objawy. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

3 POZIOM 1 - łatwy Przetaczanie miednicy - wariant podtrzymujący

Leżąc na plecach wykonuj małe ruchy przodo- i tyłopochylenia miednicy. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Bez mocnego dociskania pleców. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

4 POZIOM 2 - średni Most - 2 serie kontrolne 2-3x/tydz.

Unieś biodra do linii tułowia i ud, utrzymując swobodny oddech. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie przeprostuj lędźwi. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Bird dog - seria jakościowa 2-3x/tydz.

Z klęku podpartego wyprostuj przeciwną rękę i nogę bez rotacji miednicy. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Zakres mniejszy przy bólu. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.