

Stabilizacja miednicy / okolica SI

1. tydzień - Etap wprowadzający - technika, tolerancja ruchu, mała/umiarkowana objętość.

Cel
Poprawa kontroli obciążania miednicy i bioder w podporze obunóż i jednonóż.

Uwaga kliniczna
Ból okolicy SI wymaga różnicowania z odcinkiem lędźwiowym, biodrem i innymi źródłami bólu.

1 JOGA 1 Wojownik I - krótki wykrok

Ustaw krótki wykrok i utrzymaj miednicę skierowaną do przodu, bez zapadania tułowia.

Dawka: 20-30 s/stronę x 2

Wskazówka: Obie stopy stabilne.

2 JOGA 2 Most z oddechem

Unieś biodra i wykonaj spokojne 2-3 oddechy, potem powoli opuść.

Dawka: 5-8 x 2

Wskazówka: Bez bólu punktowego w okolicy SI.

3 POZIOM 1 - łatwy Naprzemienne odrywanie stopy w leżeniu

W leżeniu z ugiętymi kolanami unieś jedną stopę kilka centymetrów i odstaw bez kołysania miednicą.

Dawka: 8-12/stronę x 2

Wskazówka: Miednica spokojna.

4 POZIOM 2 - średni Most z naprzemiennym marszem

W górze mostu odrywaj na zmianę jedną stopę minimalnie od podłoża.

Dawka: 6-10/stronę x 2

Wskazówka: Nie opadaj biodrem.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Step-down z niskiego stopnia

Stań na niskim stopniu i powoli opuszczaj drugą piętę do podłoża, kontrolując miednicę.

Dawka: 6-10/stronę x 2-3

Wskazówka: Kolano w osi stopy.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.