

Stabilizacja miednicy / okolica SI

+2. tydzień - Progresja - większa kontrola, nieco większy zakres lub dłuższy czas pracy.

Cel
Poprawa kontroli obciążania miednicy i bioder w podporze obunóż i jednonóż.

Uwaga kliniczna
Ból okolicy SI wymaga różnicowania z odcinkiem lędźwiowym, biodrem i innymi źródłami bólu.

1 JOGA 1 Wojownik I - krótki wykrok - progresja

Ustaw krótki wykrok i utrzymaj miednicę skierowaną do przodu, bez zapadania tułowia. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Obie stopy stabilne. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

2 JOGA 2 Most z pauzą 2-3 s

Unieś biodra i wykonaj spokojne 2-3 oddechy, potem powoli opuść. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Bez bólu punktowego w okolicy SI. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

3 POZIOM 1 - łatwy Naprzemienne odrywanie stopy w leżeniu - progresja

W leżeniu z ugiętymi kolanami unieś jedną stopę kilka centymetrów i odstaw bez kołysania miednicą. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Miednica spokojna. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

4 POZIOM 2 - średni Most z pauzą 2-3 s

W górze mostu odrywaj na zmianę jedną stopę minimalnie od podłoża. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Nie opadaj biodrem. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Step-down z niskiego stopnia - progresja

Stań na niskim stopniu i powoli opuszczaj drugą piętę do podłoża, kontrolując miednicę. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Kolano w osi stopy. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.