

Ściągno Achillesa / łydka

1. tydzień - Etap wprowadzający - technika, tolerancja ruchu, mała/umiarkowana objętość.

Cel
Stopniowe zwiększenie siły i tolerancji ścięgna Achillesa oraz mięśni łydki.

Uwaga kliniczna
Nagły trzask, utrata odepchnięcia lub dodatni test Thompsona wymagają pilnej diagnostyki ruptury.

1 JOGA 1 Pies z głową w dół - łagodnie

Unieś biodra, kolana mogą być ugięte, a pięty wysoko. Stopniowo wydłużaj łydki bez ostrego bólu.

Dawka: 20-30 s x 2

Wskazówka: Bez sprężynowania.

2 JOGA 2 Wykrok z tylną piętą na ziemi

Stań w wykroku i delikatnie przenieś ciężar do przodu, utrzymując tylną piętę na podłożu.

Dawka: 20-30 s/stronę x 2

Wskazówka: Rozciąganie łagodne.

3 POZIOM 1 - łatwy Wspięcia obunóż

Przy podparciu unieś obie pięty i powoli opuść.

Dawka: 10-15 x 2-3

Wskazówka: Ruch spokojny.

4 POZIOM 2 - średni Wspięcia z większym obciążeniem jednej nogi

Unieś pięty obunóż, przenieś nieco więcej ciężaru na jedną stronę podczas opuszczania.

Dawka: 8-12/stronę x 2-3

Wskazówka: Bez gwałtownego spadania pięty.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Wspięcie jednonóż

Przy lekkim podparciu wykonuj wspięcia na jednej nodze.

Dawka: 6-12/stronę x 2-3

Wskazówka: Zakres i tempo dostosuj do reakcji następnego dnia.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.