

Ściągno Achillesa / łydka

+2. tydzień - Progresja - większa kontrola, nieco większy zakres lub dłuższy czas pracy.

Cel
Stopniowe zwiększenie siły i tolerancji ścięgna Achillesa oraz mięśni łydki.

Uwaga kliniczna
Nagły trzask, utrata odepchnięcia lub dodatni test Thompsona wymagają pilnej diagnostyki ruptury.

1 JOGA 1 Pies z głową w dół - łagodnie - progresja

Unieś biodra, kolana mogą być ugięte, a pięty wysoko. Stopniowo wydłużaj łydki bez ostrego bólu. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Bez sprężynowania. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

2 JOGA 2 Wykrok z tylną piętą na ziemi - progresja

Stań w wykroku i delikatnie przenieś ciężar do przodu, utrzymując tylną piętę na podłożu. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Rozciąganie łagodne. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

3 POZIOM 1 - łatwy Wspięcia z pauzą w górze

Przy podparciu unieś obie pięty i powoli opuść. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Ruch spokojny. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

4 POZIOM 2 - średni Wspięcia z pauzą w górze

Unieś pięty obunóż, przenieś nieco więcej ciężaru na jedną stronę podczas opuszczania. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Bez gwałtownego spadania pięt. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Wspięcia z pauzą w górze

Przy lekkim podparciu wykonuj wspięcia na jednej nodze. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Zakres i tempo dostosuj do reakcji następnego dnia. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.