

Ból pięty / rozciągnio podeszwowe

+4. tydzień - Etap funkcjonalny - mniej podparcia, większa kontrola i tolerancja obciążenia.

Cel
Poprawa tolerancji rozciągnia podeszwowego i łydki na obciążenie oraz kontrola łuku stopy.

Uwaga kliniczna
Przy bólu pięty z drętwieniem, znacznym obrzękiem lub urazem różnicuj inne przyczyny.

1 JOGA 1 Pies z głową w dół z ugiętymi kolanami - wariant funkcjonalny

Utrzymaj biodra wysoko, pięty uniesione i stopniowo prostuj kolana bez wywoływania ostrego bólu pięty. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Nie wymuszaj pięt na ziemi. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

2 JOGA 2 Góra z aktywnym łukiem - wariant funkcjonalny

Stań boso i utrzymaj trójnóg stopy, delikatnie unosząc łuk bez podwijania palców. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Palce rozluźnione. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

3 POZIOM 1 - łatwy Rozciąganie palucha w siadzie - wariant funkcjonalny

Założ nogę na nogę i delikatnie odciągnij paluch ku górze, czując napięcie pod stopą. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Bez ostrego bólu. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

4 POZIOM 2 - średni Krótka stopa w podporze jednonóż

Aktywuj łuk stopy bez zginania palców i utrzymaj kilka sekund. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Nacisk pod piętą i podstawami I/V śródstopia. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Wspięcia jednonóż / większe obciążenie jednej nogi

Umieść zrolowany ręcznik pod palcami i wykonuj powolne wspięcia na palce. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Zaczynij obunóż. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.