

Chód / przenoszenie ciężaru / wysoki marsz

+2. tydzień - Progresja - większa kontrola, nieco większy zakres lub dłuższy czas pracy.

Cel
Poprawa inicjacji kroku, obciążania kończyn i kontroli stopy podczas chodu.

Uwaga kliniczna
Przy chorobach neurologicznych dobierz objętość do zmęczenia, spastyczności i bezpieczeństwa. Nowy nagły deficyt wymaga diagnostyki.

1 JOGA 1 Góra z przenoszeniem ciężaru - progresja

Stań stabilnie i powoli przesuwaj ciężar przód-tył oraz bok-bok w małym zakresie. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Nie odrywaj stóp. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

2 JOGA 2 Wojownik II z dłuższym utrzymaniem

Stań szeroko przy blacie, ugnij jedną nogę i utrzymaj stabilne obciążenie obu stóp. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Podparcie ręką dozwolone. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

3 POZIOM 1 - łatwy Marsz w miejscu bez stałego podparcia

Trzymając się blatu unosz naprzemiennie kolana do wygodnej wysokości. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Tułów możliwie pionowo. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

4 POZIOM 2 - średni Krok w przód i powrót - progresja

Z pozycji stojącej wykonaj krok w przód, przenieś ciężar na przednią nogę i wróć. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Pełny kontakt stopy z podłożem. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Chód po linii z zatrzymaniem - progresja

Idź powoli po wyznaczonej linii, co kilka kroków zatrzymaj się i ustabilizuj. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Asekuracja według potrzeb. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.