

Chód / przenoszenie ciężaru / wysoki marsz

+4. tydzień - Etap funkcjonalny - mniej podparcia, większa kontrola i tolerancja obciążenia.

Cel
Poprawa inicjacji kroku, obciążania kończyn i kontroli stopy podczas chodu.

Uwaga kliniczna
Przy chorobach neurologicznych dobierz objętość do zmęczenia, spastyczności i bezpieczeństwa. Nowy nagły deficyt wymaga diagnostyki.

1 JOGA 1 Góra z przenoszeniem ciężaru - wariant funkcjonalny

Stań stabilnie i powoli przesuwaj ciężar przód-tył oraz bok-bok w małym zakresie. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Nie odrywaj stóp. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

2 JOGA 2 Wojownik II z płynnym przejściem przód-tył

Stań szeroko przy blacie, ugnij jedną nogę i utrzymaj stabilne obciążenie obu stóp. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Podparcie ręką dozwolone. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

3 POZIOM 1 - łatwy Marsz z pauzą na jednej nodze

Trzymając się blatu unosź naprzemiennie kolana do wygodnej wysokości. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Tułów możliwie pionowo. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

4 POZIOM 2 - średni Krok w przód i powrót - wariant funkcjonalny

Z pozycji stojącej wykonaj krok w przód, przenieś ciężar na przednią nogę i wróć. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Pełny kontakt stopy z podłożem. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Chód po linii z zatrzymaniem - wariant funkcjonalny

Idź powoli po wyznaczonej linii, co kilka kroków zatrzymaj się i ustabilizuj. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Asekuracja według potrzeb. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.