

Stopa po unieruchomieniu / po gipsie

1. tydzień - Etap wprowadzający - technika, tolerancja ruchu, mała/umiarkowana objętość.

Cel
Odzyskanie ruchomości stawu skokowego, kontroli stopy, siły łydki i pewnego obciążania po zakończeniu unieruchomienia.

Uwaga kliniczna
Zakres obciążania musi być zgodny z zaleceniem lekarza prowadzącego. Narastający obrzęk, zaczerwienienie lub ból łydki wymagają oceny.

1 JOGA 1 Pies z głową w dół - odciążony

Z podporu unieś biodra, pozostaw kolana ugięte i przenoś delikatnie ciężar między stopami.

Dawka: 15-25 s x 2

Wskazówka: Bez forsowania pięty.

2 JOGA 2 Góra z równym obciążeniem

Stań przy podparciu i stopniowo wyrównuj ciężar na obu stopach.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Nie unikaj stopy, ale też nie przekraczaj zaleceń obciążania.

3 POZIOM 1 - łatwy Alfabet stopą

Siedząc wykonuj stopą małe ruchy jak przy pisaniu liter alfabetu.

Dawka: 1 alfabet lub 1-2 min

Wskazówka: Ruch z kostki, nie całej nogi.

4 POZIOM 2 - średni Kolano do ściany

Przy pięcie na podłożu przesuwaj kolano w stronę ściany i wracaj.

Dawka: 8-12 x 2

Wskazówka: Bez ostrego bólu.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Stanie jedno nogę przy podparciu

Przenieś ciężar na leżącą nogę i utrzymaj równowagę przy ścianie lub blacie.

Dawka: 15-30 s x 2-3

Wskazówka: Nie progresuj, jeśli obrzęk wyraźnie narasta.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.