

Rwa kulszowa

+2. tydzień - Progresja - większa kontrola, nieco większy zakres lub dłuższy czas pracy.

Cel
Łagodne utrzymanie ruchu, poprawa tolerancji obciążenia i ślizgu struktur nerwowych bez nasilania objawów w nodze.

Uwaga kliniczna
W rwie nie ma jednego dobrego kierunku ruchu dla wszystkich. Wybieraj ćwiczenia, po których ból/drętwienie nie schodzi dalej do stopy. Pilna konsultacja: drętwienie okolicy krocza, zaburzenia oddawania moczu/stolca, szybko narastające osłabienie nogi lub objawy obustronne.

1 JOGA 1 Sfinks z aktywnym wydłużeniem

Połoń się na brzuchu, oprzyj przedramiona pod barkami i unieś klatkę bez zaciskania pośladków. Biodra zostają na podłożu. Oddychaj spokojnie. Wykonuj tylko wtedy, gdy objawy w nodze nie nasilają się ani nie schodzą niżej. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Ruch ma być komfortowy; może być odczuwalny w plecach, ale nie powinien zwiększać promieniowania. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

2 JOGA 2 Pozycja dziecka z sięganiem bocznym

Usiądź pośladkami w kierunku pięt, kolana ustaw szerzej i wyciągnij ręce do przodu. Nie wciskaj się na siłę w zgięcie. Jeśli zgięcie nasila promieniowanie, pominię tę pozycję. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Wybieraj tylko kierunek, po którym noga czuje się tak samo lub lepiej. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

3 POZIOM 1 - łatwy Ślizg nerwu w większym bezbolesnym zakresie

Połoń się na plecach. Zegnij biodro i kolano do wygodnej pozycji, podtrzymując udo rękami. Powoli prostuj kolano i jednocześnie kieruj palce stopy do siebie; wracając, zegnij kolano i rozluźnij stopę. To ma być płynny ślizg, nie mocne rozciąganie. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Bez długiego przytrzymania i bez wywoływania narastającego mrowienia. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

4 POZIOM 2 - średni Most z pauzą 2-3 s

Leżenie na plecach, kolana ugięte, stopy na szerokość bioder. Lekko napnij brzuch i unieś miednicę do linii barki-biodrakolana. Opuść powoli. Nie wyginaj mocno odcinka lędźwiowego. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Ciężar rozłóż równo na obu stopach. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Bird dog z pauzą 3 s

Kłęk podparty. Utrzymaj spokojny tułów i wyprostuj jednocześnie jedną nogę oraz przeciwną rękę. Wróć bez kołysania miednicą i zmień stronę. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Zakres kończyny mniejszy, jeśli pojawia się ból promieniujący. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.