

Przodopochylenie miednicy

Podtrzymanie - Utrzymanie efektu - mniejsza częstotliwość, dobra jakość i funkcjonalne warianty.

Cel
Nauka ustawienia miednicy bliżej pozycji neutralnej, poprawa kontroli mięśni brzucha i pośladków oraz tolerancji wyprostu biodra.

Uwaga kliniczna
Samo przodopochylenie nie jest chorobą. Ćwiczymy wtedy, gdy to ustawienie wiąże się z bólem, przeciążeniem lub słabą kontrolą ruchu.

1 JOGA 1 Niski wykrok z podwinięciem miednicy - wariant podtrzymujący

Z klęku wysuń jedną stopę do przodu. Delikatnie podwiń miednicę „ogon pod siebie”, napnij pośladek nogi zakroczonej i przesunij tułów minimalnie do przodu. Nie rób przeprostu lędźwi. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Rozciąganie powinno być z przodu biodra nogi zakroczonej. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

2 JOGA 2 Pozycja dziecka jako reset ruchowy

Usiądź w kierunku pięt i wydłuż plecy, wyciągając ręce przed siebie. Oddychaj do dolnych żeber i rozluźnij odcinek lędźwiowy. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie dociskaj pośladków na siłę do pięt. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

3 POZIOM 1 - łatwy Tyłopochylenie miednicy w leżeniu - wariant podtrzymujący

Leżenie na plecach, kolana ugięte. Na wydechu delikatnie zbliż dolne żebra do miednicy i spłaszcz lędźwie do podłoża. Wróć do neutralnej pozycji bez odrywania stóp. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Ruch ma pochodzić z miednicy, nie z mocnego napinania szyi. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

4 POZIOM 2 - średni Most - 2 serie kontrolne 2-3x/tydz.

Najpierw delikatnie ustaw miednicę neutralnie lub lekko podwiń, potem unieś biodra. Utrzymaj żebra „nad miednicą”, bez wypychania brzucha w górę. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Poczuj pośladki, nie tylko lędźwie. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Wykrok w tył z kontrolą tułowia - wariant podtrzymujący

Stań prosto, zrób krok w tył i zejź w dół. Utrzymuj żebra nad miednicą, brzuch lekko aktywny i pośladek nogi podporowej napięty. Wróć do stania. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie pozwalaj, aby miednica uciekała w duży przeprost lędźwiowy. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.