

Tyłopochylenie miednicy

+2. tydzień - Progresja - większa kontrola, nieco większy zakres lub dłuższy czas pracy.

Cel
Poprawa tolerancji lekkiego wyprostu, nauka swobodnego przodopochylenia miednicy i lepszego zgięcia w biodrach zamiast „podwijania” całych pleców.

Uwaga kliniczna
Tyłopochylenie samo w sobie bywa wariantem postawy. Ćwiczenia mają poprawiać kontrolę ruchu, a nie wymuszać jedną stałą pozycję.

1 JOGA 1 Sfinks z aktywnym wydłużeniem

Położ się na brzuchu i oprzyj na przedramionach. Unieś mostek, pozostawiając biodra i brzuch rozluźnione. Nie zaciskaj odcinka lędźwiowego. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Oddychaj spokojnie; zmniejsz zakres przy bólu lędźwi. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

2 JOGA 2 Krowa w klęku podpartym - progresja

Z klęku podpartego delikatnie unieś kość ogonową i mostek, tworząc łagodny łuk. Nie zapadaj się w barkach. Następnie wróć do neutralnej pozycji. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Ruch wykonuj segmentalnie i bez bólu. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

3 POZIOM 1 - łatwy Przodopochylenie miednicy w siadzie - progresja

Usiądź na brzegu krzesła. Bez poruszania klatką piersiową przetocz miednicę do przodu tak, aby poczuć ciężar bardziej na przedniej części guzów kulszowych. Wróć do środka. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Mały, precyzyjny ruch jest lepszy niż duże wyginanie pleców. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

4 POZIOM 2 - średni Hip hinge przy ścianie - progresja

Stań 20-30 cm przed ścianą tyłem do niej. Cofnij biodra, jakbyś chciał dotknąć pośladkami ściany, utrzymując długi kręgosłup. Wróć przez wyprost bioder. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Kolana lekko ugięte, ciężar na całej stopie. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Skłon rumuński bez obciążenia - progresja

Stań prosto. Cofnij biodra i pochyl tułów z prostym, wydłużonym kręgosłupem, aż poczujesz tył ud. Wróć, napinając pośladki. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Nie podwijaj miednicy w dolnej fazie i nie zaokrąglaj lędźwi. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.