

Tyłopochylenie miednicy

+4. tydzień - Etap funkcjonalny - mniej podparcia, większa kontrola i tolerancja obciążenia.

Cel
Poprawa tolerancji lekkiego wyprostu, nauka swobodnego przodopochylenia miednicy i lepszego zgięcia w biodrach zamiast „podwijania” całych pleców.

Uwaga kliniczna
Tyłopochylenie samo w sobie bywa wariantem postawy. Ćwiczenia mają poprawiać kontrolę ruchu, a nie wymuszać jedną stałą pozycję.

1 JOGA 1

Sfinks -> niska kobra, jeśli tolerowana

Połóż się na brzuchu i oprzyj na przedramionach. Unieś mostek, pozostawiając biodra i brzuch rozluźnione. Nie zaciskaj odcinka lędźwiowego. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Oddychaj spokojnie; zmniejsz zakres przy bólu lędźwi. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

2 JOGA 2

Krowa w kłęku podpartym - wariant funkcjonalny

Z kłęku podpartego delikatnie unieś kość ogonową i mostek, tworząc łagodny łuk. Nie zapadaj się w barkach. Następnie wróć do neutralnej pozycji. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Ruch wykonuj segmentalnie i bez bólu. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

3 POZIOM 1 - łatwy

Przodopochylenie miednicy w siadzie - wariant funkcjonalny

Usiądź na brzegu krzesła. Bez poruszania klatką piersiową przetocz miednicę do przodu tak, aby poczuć ciężar bardziej na przedniej części guzów kulszowych. Wróć do środka. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Mały, precyzyjny ruch jest lepszy niż duże wyginanie pleców. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

4 POZIOM 2 - średni

Hip hinge przy ścianie - wariant funkcjonalny

Stań 20-30 cm przed ścianą tyłem do niej. Cofnij biodra, jakbyś chciał dotknąć pośladkami ściany, utrzymując długi kręgosłup. Wróć przez wyprost bioder. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Kolana lekko ugięte, ciężar na całej stopie. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

5 POZIOM 3 - trudniejszy

Skłon rumuński bez obciążenia - wariant funkcjonalny

Stań prosto. Cofnij biodra i pochyl tułów z prostym, wydłużonym kręgosłupem, aż poczujesz tył ud. Wróć, napinając pośladki. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Nie podwijaj miednicy w dolnej fazie i nie zaokrąglaj lędźwi. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.