

Tyłopochylenie miednicy

Podtrzymanie - Utrzymanie efektu - mniejsza częstotliwość, dobra jakość i funkcjonalne warianty.

Cel
Poprawa tolerancji lekkiego wyprostu, nauka swobodnego przodopochylenia miednicy i lepszego zgięcia w biodrach zamiast „podwijania” całych pleców.

Uwaga kliniczna
Tyłopochylenie samo w sobie bywa wariantem postawy. Ćwiczenia mają poprawiać kontrolę ruchu, a nie wymuszać jedną stałą pozycję.

1 JOGA 1 Sfinks/kobra - płynna mobilizacja

Położ się na brzuchu i oprzyj na przedramionach. Unieś mostek, pozostawiając biodra i brzuch rozluźnione. Nie zaciskaj odcinka lędźwiowego. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Oddychaj spokojnie; zmniejsz zakres przy bólu lędźwi. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

2 JOGA 2 Krowa w klęku podpartym - wariant podtrzymujący

Z klęku podpartego delikatnie unieś kość ogonową i mostek, tworząc łagodny łuk. Nie zapadaj się w barkach. Następnie wróć do neutralnej pozycji. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Ruch wykonuj segmentalnie i bez bólu. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

3 POZIOM 1 - łatwy Przodopochylenie miednicy w siadzie - wariant podtrzymujący

Usiądź na brzegu krzesła. Bez poruszania klatką piersiową przetocz miednicę do przodu tak, aby poczuć ciężar bardziej na przedniej części guzów kulszowych. Wróć do środka. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Mały, precyzyjny ruch jest lepszy niż duże wyginanie pleców. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

4 POZIOM 2 - średni Hip hinge przy ścianie - wariant podtrzymujący

Stań 20-30 cm przed ścianą tyłem do niej. Cofnij biodra, jakbyś chciał dotknąć pośladkami ściany, utrzymując długi kręgosłup. Wróć przez wyprost bioder. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Kolana lekko ugięte, ciężar na całej stopie. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Skłon rumuński bez obciążenia - wariant podtrzymujący

Stań prosto. Cofnij biodra i pochyl tułów z prostym, wydłużonym kręgosłupem, aż poczujesz tył ud. Wróć, napinając pośladki. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie podwijaj miednicy w dolnej fazie i nie zaokrąglaj lędźwi. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.