

Koślawość kolan

+4. tydzień - Etap funkcjonalny - mniej podparcia, większa kontrola i tolerancja obciążenia.

Cel
Poprawa kontroli osi biodro-kolano-stopa podczas przysiadu, wstawania i podporu jedno nogi.

Uwaga kliniczna
U dzieci i dorosłych część koślawości może wynikać z budowy anatomicznej. Ćwiczenia poprawiają kontrolę funkcjonalną, ale nie „prostują kości”.

1 JOGA 1 Wojownik II z płynnym przejściem przód-tył

Stań szeroko. Ugnij przednie kolano nad stopą, pilnując aby kierowało się w stronę 2.-3. palca. Tylna noga wyprostowana, miednica stabilna. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Kolano nie zapada się do środka. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

2 JOGA 2 Krzesło z wolnym wstawaniem i siadaniem

Stań na szerokość bioder, cofnij biodra jak do siadania i ugnij kolana. Utrzymuj stopy w trzech punktach podparcia i kolana nad stopami. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Nie ściskaj kolan na siłę; utrzymuj naturalną oś. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

3 POZIOM 1 - łatwy Odwodzenie nogi bokiem w leżeniu - wariant funkcjonalny

Położ się na boku, dolna noga może być ugięta. Górną nogę wyprostuj i unieś lekko w bok, z palcami skierowanymi do przodu. Powoli opuść. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Nie obracaj miednicy do tyłu. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

4 POZIOM 2 - średni Wstawanie z asymetrycznym ustawieniem stóp

Usiądź na brzegu krzesła, stopy na szerokość bioder. Wstań, utrzymując kolana w osi stóp, potem powoli usiądź. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Możesz zacząć od wyższego krzesła. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Przysiad jedno nogi do krzesła - wariant funkcjonalny

Stań przed wysokim krzesłem na jednej nodze. Cofnij biodro i dotknij pośladkiem siedziska, następnie wstań. Kolano utrzymuj nad 2.-3. palcem stopy. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Zacznij od bardzo wysokiego podparcia i małego zakresu. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.