

Płaskostopie

1. tydzień - Etap wprowadzający - technika, tolerancja ruchu, mała/umiarkowana objętość.

Cel
Aktywacja mięśni krótkich stopy, poprawa kontroli łuku podłużnego i równowagi bez „zaciskania” palców.

Uwaga kliniczna
Ćwiczenia mogą poprawiać funkcję stopy, ale nie każda płaska stopa wymaga korekcji. Szczególnie u dzieci ocena zależy od wieku, elastyczności i objawów.

1 JOGA 1

Góra - Tadasana z „trójnogiem” stopy

Stań boso. Dociśnij trzy punkty: piętę, podstawę palucha i podstawę małego palca. Palce rozluźnione. Delikatnie unieś łuk stopy bez podwijania palców.

Dawka: 20-30 s x 3

Wskazówka: Ciężar równomiernie na całej stopie.

2 JOGA 2

Pies z głową w dół

Z podporu unieś biodra w górę i cofnij je. Pięty mogą zostać uniesione. Wydłużaj tył nóg i łydki bez bólu w stopie.

Dawka: 20-30 s x 2-3

Wskazówka: Nie wymuszaj kontaktu pięt z podłożem.

3 POZIOM 1 - łatwy

Krótką stopą

Siedząc lub stojąc, utrzymaj piętę i głowy I oraz V kości śródstopia na podłożu. Delikatnie „skróć” stopę, przyciągając przodostopie w stronę pięt bez zginania palców.

Dawka: 5-8 s x 6-10

Wskazówka: Palce mają pozostać długie i rozluźnione.

4 POZIOM 2 - średni

Wspięcia na palce z kontrolą łuku

Stań przy ścianie. Utrzymaj trójnog stopy i unieś pięty. Powoli zejdź w dół, nie pozwalając kostkom zapadać się do środka.

Dawka: 10-15 x 2-3

Wskazówka: Nacisk pozostaje także pod podstawą palucha.

5 POZIOM 3 - trudniejszy

Stanie jednonóż z krótką stopą

Stań na jednej nodze i utrzymaj aktywny łuk bez chwytania podłoża palcami. Gdy jest łatwo, wykonuj powolne ruchy drugą nogą w przód, bok i tył.

Dawka: 20-40 s/stronę x 2-3

Wskazówka: Kolano ustawione nad stopą, miednica stabilna.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.