

Płaskostopie

+2. tydzień - Progresja - większa kontrola, nieco większy zakres lub dłuższy czas pracy.

Cel
Aktywacja mięśni krótkich stopy, poprawa kontroli łuku podłużnego i równowagi bez „zaciskania” palców.

Uwaga kliniczna
Ćwiczenia mogą poprawiać funkcję stopy, ale nie każda płaska stopa wymaga korekcji. Szczególnie u dzieci ocena zależy od wieku, elastyczności i objawów.

1 JOGA 1

Góra - Tadasana z „trójnogiem” stopy - progresja

Stań boso. Dociśnij trzy punkty: piętę, podstawę palucha i podstawę małego palca. Palce rozluźnione. Delikatnie unieś łuk stopy bez podwijania palców. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Ciężar równomiernie na całej stopie. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

2 JOGA 2

Pies z głową w dół - progresja

Z podporu unieś biodra w górę i cofnij je. Pięty mogą zostać uniesione. Wydłużaj tył nóg i łydki bez bólu w stopie. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Nie wymuszaj kontaktu pięt z podłożem. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

3 POZIOM 1 - łatwy

Krótką stopą w staniu

Siedząc lub stojąc, utrzymaj piętę i głowy I oraz V kości śródstopia na podłożu. Delikatnie „skróć” stopę, przyciągając przodostopie w stronę pięty bez zginania palców. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Palce mają pozostać długie i rozluźnione. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

4 POZIOM 2 - średni

Wspięcia z pauzą w górze

Stań przy ścianie. Utrzymaj trójnog stopy i unieś piętę. Powoli zejdź w dół, nie pozwalając kostkom zapadać się do środka. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Nacisk pozostaje także pod podstawą palucha. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

5 POZIOM 3 - trudniejszy

Stanie na jednej nodze z krótką stopą - progresja

Stań na jednej nodze i utrzymaj aktywny łuk bez chwytania podłoża palcami. Gdy jest łatwo, wykonuj powolne ruchy drugą nogą w przód, bok i tył. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Kolano ustawione nad stopą, miednica stabilna. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.