

Płaskostopie

+4. tydzień - Etap funkcjonalny - mniej podparcia, większa kontrola i tolerancja obciążenia.

Cel
Aktywacja mięśni krótkich stopy, poprawa kontroli łuku podłużnego i równowagi bez „zaciskania” palców.

Uwaga kliniczna
Ćwiczenia mogą poprawiać funkcję stopy, ale nie każda płaska stopa wymaga korekcji. Szczególnie u dzieci ocena zależy od wieku, elastyczności i objawów.

1 JOGA 1

Góra - Tadasana z „trójnogiem” stopy - wariant funkcjonalny

Stań boso. Dociśnij trzy punkty: piętę, podstawę palucha i podstawę małego palca. Palce rozluźnione. Delikatnie unieś łuk stopy bez podwijania palców. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Ciężar równomiernie na całej stopie. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

2 JOGA 2

Pies z głową w dół - wariant funkcjonalny

Z podporu unieś biodra w górę i cofnij je. Pięty mogą zostać uniesione. Wydłużaj tył nóg i łydki bez bólu w stopie. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Nie wymuszaj kontaktu pięt z podłożem. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

3 POZIOM 1 - łatwy

Krótką stopą w podparze jednonóż

Siedząc lub stojąc, utrzymaj piętę i głowy I oraz V kości śródstopia na podłożu. Delikatnie „skróć” stopę, przyciągając przodostopie w stronę pięty bez zginania palców. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Palce mają pozostać długie i rozluźnione. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

4 POZIOM 2 - średni

Wspięcia jednonóż / większe obciążenie jednej nogi

Stań przy ścianie. Utrzymaj trójnog stopy i unieś piętę. Powoli zejdź w dół, nie pozwalając kostkom zapadać się do środka. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Nacisk pozostaje także pod podstawą palucha. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

5 POZIOM 3 - trudniejszy

Stanie jednonóż z krótką stopą - wariant funkcjonalny

Stań na jednej nodze i utrzymaj aktywny łuk bez chwytania podłoża palcami. Gdy jest łatwo, wykonuj powolne ruchy drugą nogą w przód, bok i tył. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Kolano ustawione nad stopą, miednica stabilna. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.