

Poprawa ruchomości całego kręgosłupa

+4. tydzień - Etap funkcjonalny - mniej podparcia, większa kontrola i tolerancja obciążenia.

Cel
Łagodny ruch odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego w kilku kierunkach, bez forsowania końcowych zakresów.

Uwaga kliniczna
Przy osteoporozie, świeżym urazie, zawrotach głowy po ruchu szyi lub objawach neurologicznych zakres powinien ustalić fizjoterapeuta.

1 JOGA 1 Kot-krowa + przejście do neutralnej stabilizacji

W klęku podpartym na wydechu zaokrąglaj plecy i opuść głowę, a na wdechu delikatnie unieś mostek i kość ogonową. Ruch prowadź płynnie od miednicy po szyję. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Nie dociskaj szyi do końcowego zakresu. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

2 JOGA 2 Sfinks -> niska kobra, jeśli tolerowana

Z pozycji dziecka przejdź płynnie do leżenia na brzuchu i podeprzyj się na przedramionach w sfinksie. Następnie wróć. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Ruch spokojny, bez ostrego bólu i bez szarpania. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

3 POZIOM 1 - łatwy Otwieranie książki z sięganiem ramienia

Leżenie na boku, biodra i kolana ugięte, ręce wyciągnięte przed sobą. Otwórz górną rękę do tyłu, prowadząc za nią klatkę piersiową. Kolana pozostają razem. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Głowa może podążać za dłonią, jeśli nie wywołuje zawrotów. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

4 POZIOM 2 - średni Wyprost piersiowy na krześle - wariant funkcjonalny

Usiądź, oprzyj górną część pleców o oparcie. Dłonie za głowę. Delikatnie odchyl klatkę piersiową nad oparciem, bez dużego przeprostu lędźwi. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Ruch ma być głównie w piersiowym odcinku kręgosłupa. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Skłon + wyprost segmentalny w stanie - wariant funkcjonalny

Z pozycji stojącej powoli opuszczaj brodę i zaokrąglaj kręgosłup od góry, schodząc tylko do wygodnego zakresu. Wróć powoli, ustawiając kręgi „jeden po drugim”. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Nie wykonuj przy osteoporozie bez wcześniejszej konsultacji. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.