

Ból głowy

1. tydzień - Etap wprowadzający - technika, tolerancja ruchu, mała/umiarkowana objętość.

Cel

Zmniejszenie napięcia szyi i obręczy barkowej przy bólach napięciowych lub szyjnopochodnych oraz poprawa kontroli odcinka szyjnego.

Uwaga kliniczna

Te ćwiczenia nie są przeznaczone do nagłego, bardzo silnego bólu głowy ani bólu z niedowładem/drętwieniem twarzy lub kończyn, zaburzeniami mowy, widzenia, równowagi, gorączką ze sztywnością karku albo po urazie głowy.

1 JOGA 1

Pozycja dziecka z podparciem czoła

Usiądź w kierunku pięt, oprzyj czoło na dłoniach lub poduszce i pozwól barkom opaść. Oddychaj spokojnie, wydłużając wydechy.

Dawka: 1-2 min

Wskazówka: Szyja ma być całkowicie rozluźniona.

2 JOGA 2

Nogi na ścianie - Viparita Karani

Położ się na plecach blisko ściany i oprzyj na niej nogi. Podeprzyj głowę cienką poduszką, jeśli tego potrzebujesz. Rozluźnij szczękę i barki.

Dawka: 2-5 min

Wskazówka: Pomiń, jeśli pozycja zwiększa ból głowy lub ciśnienie w głowie.

3 POZIOM 1 - łatwy

Cofnięcie brody

Siedząc lub leżąc, przesun głowę poziomo do tyłu, jakbyś robił delikatny „podwójny podbródek”. Nie pochylaj głowy w dół.

Dawka: 5 s x 8-10

Wskazówka: Ruch ma być mały i bez bólu promieniującego.

4 POZIOM 2 - średni

Łopatki w dół i lekko do tyłu

Usiądź prosto. Delikatnie ustaw łopatki w dół i do środka, bez wypinania klatki i bez unoszenia barków. Utrzymaj, rozluźnij.

Dawka: 5 s x 8-12

Wskazówka: Nie ściskaj łopatek maksymalnie.

5 POZIOM 3 - trudniejszy

Kontrolowana rotacja szyi

Usiądź prosto. Powoli obróć głowę w prawo do komfortowego zakresu, wróć do środka i powtórz w lewo.

Dawka: 6-10/stronę

Wskazówka: Przerwij przy zawrotach, zaburzeniach widzenia lub wyraźnym nasileniu bólu głowy.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.