

Ból głowy

+2. tydzień - Progresja - większa kontrola, nieco większy zakres lub dłuższy czas pracy.

Cel

Zmniejszenie napięcia szyi i obręczy barkowej przy bólach napięciowych lub szyjnopochodnych oraz poprawa kontroli odcinka szyjnego.

Uwaga kliniczna

Te ćwiczenia nie są przeznaczone do nagłego, bardzo silnego bólu głowy ani bólu z niedowładem/drętwieniem twarzy lub kończyn, zaburzeniami myślenia, widzenia, równowagi, gorączką ze sztywnością karku albo po urazie głowy.

1 JOGA 1

Pozycja dziecka z sięganiem bocznym

Usiądź w kierunku pięt, oprzyj czoło na dłoniach lub poduszce i pozwól barkom opaść. Oddychaj spokojnie, wydłużając wydech. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Szyja ma być całkowicie rozluźniona. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

2 JOGA 2

Nogi na ścianie - Viparita Karani - progresja

Połóż się na plecach blisko ściany i oprzyj na niej nogi. Podeprzyj głowę cienką poduszką, jeśli tego potrzebujesz. Rozluźnij szczękę i barki. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Pomiń, jeśli pozycja zwiększa ból głowy lub ciśnienie w głowie. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

3 POZIOM 1 - łatwy

Cofnięcie brody przy ścianie

Siedząc lub leżąc, przesunij głowę poziomo do tyłu, jakbyś robił delikatny „podwójny podbródek”. Nie pochylaj głowy w dół. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Ruch ma być mały i bez bólu promieniującego. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

4 POZIOM 2 - średni

Łopatki w dół i lekko do tyłu - progresja

Usiądź prosto. Delikatnie ustaw łopatki w dół i do środka, bez wypinania klatki i bez unoszenia barków. Utrzymaj, rozluźnij. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Nie ściskaj łopatek maksymalnie. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

5 POZIOM 3 - trudniejszy

Kontrolowana rotacja szyi - progresja

Usiądź prosto. Powoli obróć głowę w prawo do komfortowego zakresu, wróć do środka i powtórz w lewo. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Przerwij przy zawrotach, zaburzeniach widzenia lub wyraźnym nasileniu bólu głowy. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.