

Ból głowy

+4. tydzień - Etap funkcjonalny - mniej podparcia, większa kontrola i tolerancja obciążenia.

Cel

Zmniejszenie napięcia szyi i obręczy barkowej przy bólach napięciowych lub szyjnopochodnych oraz poprawa kontroli odcinka szyjnego.

Uwaga kliniczna

Te ćwiczenia nie są przeznaczone do nagłego, bardzo silnego bólu głowy ani bólu z niedowładem/drętwieniem twarzy lub kończyn, zaburzeniami mowy, widzenia, równowagi, gorączką ze sztywnością karku albo po urazie głowy.

1 JOGA 1

Pozycja dziecka -> klęk podparty

Usiądź w kierunku pięt, oprzyj czoło na dłoniach lub poduszce i pozwól barkom opaść. Oddychaj spokojnie, wydłużając wydech. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Szyja ma być całkowicie rozluźniona. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

2 JOGA 2

Nogi na ścianie - Viparita Karani - wariant funkcjonalny

Położ się na plecach blisko ściany i oprzyj na niej nogi. Podeprzyj głowę cienką poduszką, jeśli tego potrzebujesz. Rozluźnij szczękę i barki. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Pomiń, jeśli pozycja zwiększa ból głowy lub ciśnienie w głowie. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

3 POZIOM 1 - łatwy

Cofnięcie brody + mała rotacja

Siadając lub leżąc, przesun głowę poziomo do tyłu, jakbyś robił delikatny „podwójny podbródek”. Nie pochylaj głowy w dół. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Ruch ma być mały i bez bólu promieniującego. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

4 POZIOM 2 - średni

Łopatki w dół i lekko do tyłu - wariant funkcjonalny

Usiądź prosto. Delikatnie ustaw łopatki w dół i do środka, bez wypinania klatki i bez unoszenia barków. Utrzymaj, rozluźnij. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Nie ściskaj łopatek maksymalnie. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

5 POZIOM 3 - trudniejszy

Kontrolowana rotacja szyi - wariant funkcjonalny

Usiądź prosto. Powoli obróć głowę w prawo do komfortowego zakresu, wróć do środka i powtórz w lewo. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Przerwij przy zawrotach, zaburzeniach widzenia lub wyraźnym nasileniu bólu głowy. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.