

Ból karku

1. tydzień - Etap wprowadzający - technika, tolerancja ruchu, mała/umiarkowana objętość.

Cel
Utrzymanie ruchomości szyi, aktywacja głębokich mięśni szyi i poprawa pracy łopatek.

Uwaga kliniczna
Przy bólu po urazie, nasilającej się słabości ręki, niezgrabności dłoni, zaburzeniach chodu lub nowych zaburzeniach zwieraczy potrzebna jest pilna ocena lekarska.

1 JOGA 1 Szczeniak - Uttana Shishosana

Z kłku podpartego cofnij biodra lekko w stronę pięt, a dłonie wysuń daleko do przodu. Klatkę kieruj w dół, ale szyję utrzymuj długą i swobodną.

Dawka: 20-30 s x 2-3

Wskazówka: Nie wciskaj głowy w podłogę.

2 JOGA 2 Orzeł - same ramiona

Siedząc lub stojąc, skrzyżuj ramiona przed sobą i połącz przedramiona tak, jak pozwala zakres. Unieś łokcie lekko, oddychając w górną część pleców.

Dawka: 20-30 s/stronę x 2

Wskazówka: Barki pozostają z dala od uszu.

3 POZIOM 1 - łatwy Cofnięcie brody

Przesuń głowę prosto do tyłu, utrzymując wzrok na wprost. Utrzymaj krótko i wróć.

Dawka: 5 s x 8-12

Wskazówka: Nie unosz ani nie opuszczaj brody.

4 POZIOM 2 - średni Izometria szyi

Położ dłonie na czole i delikatnie napieraj głową na dłonie bez ruchu. Powtórz z dłonią z boku głowy po obu stronach.

Dawka: 5-8 s x 4-6 w każdym kierunku

Wskazówka: Siła umiarkowana, bez zaciskania zębów.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Anioł przy ścianie

Oprzyj plecy o ścianę, broda lekko cofnięta. Przesuwaj ramiona po ścianie w górę i w dół w wygodnym zakresie, utrzymując łopatki pod kontrolą.

Dawka: 8-12 x 2-3

Wskazówka: Nie wypychaj żeber do przodu.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.