

Drętwienie palców u dłoni

+4. tydzień - Etap funkcjonalny - mniej podparcia, większa kontrola i tolerancja obciążenia.

Cel
Łagodny ruch szyi, łopatki i nerwów kończyny górnej po wcześniejszej ocenie przyczyny objawów.

Uwaga kliniczna
Drętwienie palców może pochodzić z szyi, nadgarstka, łokcia lub innych przyczyn. Zestaw należy dobrać do rozpoznania. Pilna ocena, jeśli narasta osłabienie/chwyt, pojawia się niezgrabność obu rąk, zaburzenia chodu lub nagłe objawy neurologiczne.

1 JOGA 1

Góra z rozluźnieniem barków - wariant funkcjonalny

Stań prosto, dłonie skieruj do przodu, barki opuść i wydłuż szyję. Zrób 5-6 spokojnych oddechów, nie zaciskając palców. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Dłonie i szczeka pozostają rozluźnione. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

2 JOGA 2

Anjali Mudra - dłonie przed klatką - wariant funkcjonalny

Złącz dłonie przed mostkiem bez mocnego dociskania. Ustaw nadgarstki neutralnie lub tylko lekko zgięte. Oddychaj spokojnie. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Jeśli drętwienie się nasila, zmniejsz zgięcie nadgarstka lub pomiń. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

3 POZIOM 1 - łatwy

Cofnięcie brody + mała rotacja

Usiądź prosto. Lekko cofnij brodę, a łopatkę po stronie objawów ustaw swobodnie w dół. Nie ciągnij barku na siłę. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Objawy w dłoni nie powinny narastać. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

4 POZIOM 2 - średni

Ślizg nerwu w pozycji funkcjonalnej

Ramię przy boku, łokieć zgięty. Powoli prostuj łokieć, jednocześnie odchylając nadgarstek i palce tylko do lekkiego napięcia, potem wróć. Stosuj szczególnie, gdy objawy obejmują kciuk, palec wskazujący i środkowy - po ocenie fizjoterapeuty. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: To ma być ślizg, nie mocne rozciąganie. Nie przytrzymuj końcowej pozycji. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

5 POZIOM 3 - trudniejszy

Ślizg po ścianie + odklejenie dłoni

Stań twarzą do ściany, przedramiona oprzyj o nią. Powoli przesuwaj ręce w górę, pozwalając łopatom obracać się w górę, potem wróć. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Przerwij, jeśli drętwienie wyraźnie narasta lub utrzymuje się po ćwiczeniu. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.