

Drętwienie pośladków

+2. tydzień - Progresja - większa kontrola, nieco większy zakres lub dłuższy czas pracy.

Cel
Poprawa ruchu lędźwi i bioder oraz tolerancji pozycji siedzącej, jeśli przyczyna ma charakter mechaniczny i poważne przyczyny neurologiczne zostały wykluczone.

Uwaga kliniczna
Drętwienie obu pośladków lub okolicy krocza, zwłaszcza z zaburzeniami oddawania moczu/stolca, jest objawem alarmowym - nie ćwiczyć, tylko pilnie zgłosić się do pomocy medycznej.

1 JOGA 1 Gołąb na plecach - „4” - progresja

Leżąc na plecach, połóż kostkę jednej nogi na przeciwległym udzie. Przyciągnij udo do siebie tylko do łagodnego rozciągania pośladka. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Nie dociskaj kolana na siłę. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

2 JOGA 2 Kot-krowa z oddechem

W klęku podpartym naprzemiennie zaokrąglaj i delikatnie wyginaj kręgosłup, poruszając miednicą. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Wybierz zakres, który nie zwiększa drętwienia. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

3 POZIOM 1 - łatwy Przetaczanie miednicy w leżeniu - progresja

Leżenie na plecach, kolana ugięte. Naprzemiennie delikatnie spłaszczaj lędźwie i wracaj do lekkiego łuku. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Ruch ma być mały i płynny. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

4 POZIOM 2 - średni Ślizg nerwu w większym bezbolesnym zakresie

Leżenie na plecach. Unieś udo, podtrzymując je rękami. Prostuj i zginaj kolano w małym zakresie, synchronizując ruch stopy tak, aby nie utrzymywać napięcia. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Bez nasilania drętwienia po ćwiczeniu. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Most z pauzą 2-3 s

Unieś miednicę z leżenia na plecach, utrzymując ciężar na obu stopach i spokojny oddech. Powoli wróć. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Jeśli objawy stają się bardziej rozlane lub schodzą niżej do nogi - przerwij. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.