

Drętwienie ud

+4. tydzień - Etap funkcjonalny - mniej podparcia, większa kontrola i tolerancja obciążenia.

Cel
Poprawa ruchomości biodra i odcinka lędźwiowego oraz zmniejszenie drażnienia tkanek w okolicy pachwiny/uda, gdy objawy są ocenione jako mechaniczne.

Uwaga kliniczna
Drętwienie bocznej części uda może mieć inne źródło niż drętwienie przedniej lub tylnej części. Przy narastającej słabości nogi, zaburzeniu chodu lub objawach obustronnych wymagana jest ocena neurologiczna.

1 JOGA 1 Niski wykrok - wariant funkcjonalny

Jedna noga z przodu, drugie kolano na podłożu. Delikatnie podwiń miednicę i przesun ją do przodu, czując przód biodra nogi zakrocznej. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Nie rób przeprostu lędźwi. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

2 JOGA 2 Sfinks -> niska kobra, jeśli tolerowana

Leżenie na brzuchu, podpór na przedramionach. Unieś klatkę do komfortowego wyprostu. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Wykonuj tylko, jeśli nie zwiększa drętwienia w udzie. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

3 POZIOM 1 - łatwy Kołysanie miednicą w leżeniu - wariant funkcjonalny

Leżenie na plecach, kolana ugięte. Powoli przechodź między lekkim spłaszczeniem i lekkim łukiem lędźwi. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Bez forsowania końcowego zakresu. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

4 POZIOM 2 - średni Rozciąganie zginaczy biodra w półkłęku - wariant funkcjonalny

Z półkłęku podwiń miednicę i napnij pośladki nogi z tyłu. Przesun ciało lekko do przodu. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Nie dociskaj do bólu lub mrowienia. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Wykrok w tył - wariant funkcjonalny

Z pozycji stojącej cofnij jedną nogę i obniż ciało. Wróć do stania, aktywnie pracując pośladkiem nogi podporowej. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Utrzymuj stabilną miednicę i kolano nad stopą. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.