

Drętwienie ud

Podtrzymanie - Utrzymanie efektu - mniejsza częstotliwość, dobra jakość i funkcjonalne warianty.

Cel
Poprawa ruchomości biodra i odcinka lędźwiowego oraz zmniejszenie drażnienia tkanek w okolicy pachwiny/uda, gdy objawy są ocenione jako mechaniczne.

Uwaga kliniczna
Drętwienie bocznej części uda może mieć inne źródło niż drętwienie przedniej lub tylnej części. Przy narastającej słabości nogi, zaburzeniu chodu lub objawach obustronnych wymagana jest ocena neurologiczna.

1 JOGA 1 Niski wykrok - wariant podtrzymujący

Jedna noga z przodu, drugie kolano na podłożu. Delikatnie podwiń miednicę i przesun ją do przodu, czując przód biodra nogi zakrocznej. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie rób przeprostu lędźwi. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

2 JOGA 2 Sfinks/kobra - płynna mobilizacja

Leżenie na brzuchu, podpór na przedramionach. Unieś klatkę do komfortowego wyprostu. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Wykonuj tylko, jeśli nie zwiększa drętwienia w udzie. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

3 POZIOM 1 - łatwy Kołysanie miednicą w leżeniu - wariant podtrzymujący

Leżenie na plecach, kolana ugięte. Powoli przechodź między lekkim spłaszczeniem i lekkim łukiem lędźwi. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Bez forsowania końcowego zakresu. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

4 POZIOM 2 - średni Rozciąganie zginaczy biodra w półkłęku - wariant podtrzymujący

Z półkłęku podwiń miednicę i napnij pośladek nogi z tyłu. Przesun ciało lekko do przodu. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie dociskaj do bólu lub mrowienia. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Wykrok w tył - wariant podtrzymujący

Z pozycji stojącej cofnij jedną nogę i obniż ciało. Wróć do stania, aktywnie pracując pośladkiem nogi podporowej. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Utrzymuj stabilną miednicę i kolano nad stopą. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.