

Drętwienie łydek

1. tydzień - Etap wprowadzający - technika, tolerancja ruchu, mała/umiarkowana objętość.

Cel
Łagodny ruch nerwowo-mięśniowy kończyny dolnej, poprawa pracy stawu skokowego i łydki po wcześniejszej ocenie źródła drętwienia.

Uwaga kliniczna
Nagłe drętwienie z wyraźnym osłabieniem stopy, opadaniem stopy, obustronnymi objawami lub zaburzeniami zwieraczy wymaga pilnej oceny. Obrzęk, zaczerwienienie i ból łydki wymagają wykluczenia problemu naczyniowego.

1 JOGA 1 Pies z głową w dół z ugiętymi kolanami

Z podporu unieś biodra. Kolana pozostaw lekko ugięte i naprzemiennie kieruj pięty w dół, bez mocnego ciągnięcia łydki.

Dawka: 30-45 s

Wskazówka: Nie trzymaj rozciągnięcia, jeśli wywołuje mrowienie.

2 JOGA 2 Skłon do jednej nogi w siadzie - łagodny

Usiądź z jedną nogą wyprostowaną, drugą ugiętą. Pochyl się z bioder tylko do lekkiego napięcia tyłu nogi.

Dawka: 15-20 s/stronę x 2

Wskazówka: Przy drętwieniu nie pogłębiaj rozciągania nerwu.

3 POZIOM 1 - łatwy Pompowanie stopy

Siedząc lub leżąc, naprzemiennie kieruj palce stopy do siebie i od siebie w pełnym, komfortowym zakresie.

Dawka: 15-20 x 2

Wskazówka: Ruch płynny, bez bolesnego skurczu.

4 POZIOM 2 - średni Ślizg nerwu kulszowego w siadzie

Usiądź prosto. Prostuj kolano i jednocześnie unieś głowę; wracając zginaj kolano i lekko opuszczaj brodę. Ruch wykonuj płynnie, bez przytrzymania.

Dawka: 6-10/stronę

Wskazówka: Zakres ma nie zwiększać mrowienia po serii.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Wspięcie na palce jednonóż z podparciem

Stań przy ścianie. Unieś piętę jednej nogi, powoli opuść. Utrzymuj stopę w osi i nie skręcaj kostki.

Dawka: 6-12/stronę x 2-3

Wskazówka: Jeśli pojawia się narastająca słabość, zakończ i skonsultuj objaw.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.