

Drętwienie łydek

+2. tydzień - Progresja - większa kontrola, nieco większy zakres lub dłuższy czas pracy.

Cel
Łagodny ruch nerwowo-mięśniowy kończyny dolnej, poprawa pracy stawu skokowego i łydki po wcześniejszej ocenie źródła drętwienia.

Uwaga kliniczna
Nagłe drętwienie z wyraźnym osłabieniem stopy, opadaniem stopy, obustronnymi objawami lub zaburzeniami zwieraczy wymaga pilnej oceny. Obrzęk, zaczerwienienie i ból łydki wymagają wykluczenia problemu naczyniowego.

1 JOGA 1 Pies z głową w dół z ugiętymi kolanami - progresja

Z podporu unieś biodra. Kolana pozostaw lekko ugięte i naprzemiennie kieruj pięty w dół, bez mocnego ciągnięcia łydki. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Nie trzymaj rozciągnięcia, jeśli wywołuje mrowienie. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

2 JOGA 2 Skłon do jednej nogi w siadzie - łagodny - progresja

Usiądź z jedną nogą wyprostowaną, drugą ugiętą. Pochyl się z bioder tylko do lekkiego napięcia tyłu nogi. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Przy drętwieniu nie pogłębiaj rozciągania nerwu. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

3 POZIOM 1 - łatwy Pompowanie stopy - progresja

Siedząc lub leżąc, naprzemiennie kieruj palce stopy do siebie i od siebie w pełnym, komfortowym zakresie. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Ruch płynny, bez bolesnego skurczu. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

4 POZIOM 2 - średni Ślizg nerwu w większym bezbolesnym zakresie

Usiądź prosto. Prostuj kolano i jednocześnie unieś głowę; wracając zginaj kolano i lekko opuszczaj brodę. Ruch wykonuj płynnie, bez przytrzymania. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Zakres ma nie zwiększać mrowienia po serii. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Wspięcia z pauzą w górę

Stań przy ścianie. Unieś piętę jednej nogi, powoli opuść. Utrzymuj stopę w osi i nie skręcaj kostki. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Jeśli pojawia się narastająca słabość, zakończ i skonsultuj objaw. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.