

Drętwienie łydek

+4. tydzień - Etap funkcjonalny - mniej podparcia, większa kontrola i tolerancja obciążenia.

Cel
Łagodny ruch nerwowo-mięśniowy kończyny dolnej, poprawa pracy stawu skokowego i łydki po wcześniejszej ocenie źródła drętwienia.

Uwaga kliniczna
Nagłe drętwienie z wyraźnym osłabieniem stopy, opadaniem stopy, obustronnymi objawami lub zaburzeniami zwieraczy wymaga pilnej oceny. Obrzęk, zaczerwienienie i ból łydki wymagają wykluczenia problemu naczyniowego.

1 JOGA 1 Pies z głową w dół z ugiętymi kolanami - wariant funkcjonalny

Z podporu unieś biodra. Kolana pozostaw lekko ugięte i naprzemiennie kieruj pięty w dół, bez mocnego ciągnięcia łydki. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Nie trzymaj rozciągnięcia, jeśli wywołuje mrowienie. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

2 JOGA 2 Skłon do jednej nogi w siadzie - łagodny - wariant funkcjonalny

Usiądź z jedną nogą wyprostowaną, drugą ugiętą. Pochyl się z bioder tylko do lekkiego napięcia tyłu nogi. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Przy drętwieniu nie pogłębiaj rozciągania nerwu. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

3 POZIOM 1 - łatwy Pompowanie stopy - wariant funkcjonalny

Siedząc lub leżąc, naprzemiennie kieruj palce stopy do siebie i od siebie w pełnym, komfortowym zakresie. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Ruch płynny, bez bolesnego skurczu. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

4 POZIOM 2 - średni Ślizg nerwu w pozycji funkcjonalnej

Usiądź prosto. Prostuj kolano i jednocześnie unieś głowę; wracając zginaj kolano i lekko opuszczaj brodę. Ruch wykonuj płynnie, bez przytrzymania. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Zakres ma nie zwiększać mrowienia po serii. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Wspięcia jednonóż / większe obciążenie jednej nogi

Stań przy ścianie. Unieś piętę jednej nogi, powoli opuść. Utrzymuj stopę w osi i nie skręcaj kostki. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Jeśli pojawia się narastająca słabość, zakończ i skonsultuj objaw. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.